

10 février 2022

Évaluation des symptômes non moteurs des patients parkinsoniens traités par deux stratégies liées à la thérapie par pompe à apomorphine (AGAPO)

Il n'existe actuellement aucun consensus sur le traitement concomitant adéquat à la pompe à apomorphine dans la maladie de Parkinson. En pratique, certains centres retirent tous les agonistes dopaminergiques lorsqu'ils initient un traitement par pompe à apomorphine, alors que d'autres combinent les deux. A ce jour, aucune étude n'a été menée pour déterminer la meilleure stratégie pour traiter efficacement les symptômes moteurs et non moteurs, ainsi que pour améliorer la qualité de vie des patients. Cette étude préliminaire, intitulée AGAPO, vise à identifier des différences significatives dans l'évolution des patients (symptômes non moteurs et qualité de vie), sur une durée de 6 mois, en fonction des deux stratégies adoptées dans les centres français (pompe à apomorphine avec ou sans agonistes dopaminergiques).

L'identifiant de l'étude est **NCT03693872** (www.clinicaltrials.gov)

Critères d'inclusion	Avoir plus de 18 ans Avoir une fore idiopathique de la maladie Avoir une pompe à apomorphine
Critères d'exclusion*	Personnes neuro-stimulées Problème de contrôle des impulsions
Temps de participation	6 mois
Promoteur	CHU de Rennes

* Si vous présentez un de ces critères vous ne pouvez pas participer à l'essai

Lieux et Contacts :

Hôpital Gui de Chauliac à Montpellier : Cristian GENY c-geny@chu-montpellier.fr

CH Caremeau à Nîmes : Giovanni Castelnovo giovanni.castelnovo@chu-nimes.fr

CHU La Pitié Salpêtrière à Paris : Emmanuel Flamand Roze emmanuel.flamand-roze@aphp.fr

CHU de Reims- hôpital Maison Blanche : Anne DOE DE MAINDREVILLE
adoedemaindreville@chu-reims.fr

CHU de Rennes : Marc VERIN marc.verin@chu-rennes.fr

CHU Charles Nicolle : David MALLET david.maltete@chu-rouen.fr